

**ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ**  
**19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017**  
**ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ Α**

**A1.** Θεωρία, σχολικό βιβλίο σελ. 31.

**A2.** Θεωρία, σχολικό βιβλίο σελ. 14.

**A3.** Θεωρία, σχολικό βιβλίο σελ. 72:

Πλάτος μιας κλάσης ονομάζεται η διαφορά του κατώτερου από το ανώτερο όριο της κλάσης.

**A4.** **a)**  $\Sigma$ , **b)**  $\Lambda$ , **γ)**  $\Lambda$ , **δ)**  $\Sigma$ , **ε)**  $\Lambda$

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Για τη μέση τιμή  $\bar{x}$  είναι:

$$\text{a. } \bar{x} = \frac{v_1 \cdot x_1 + v_2 \cdot x_2 + v_3 \cdot x_3 + v_4 \cdot x_4}{10} = \frac{1 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 5 + 1 \cdot 9}{10} = \frac{40}{10} = 4.$$

**β.** Οι παρατηρήσεις διατεταγμένες σε αύξουσα σειρά είναι:

1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 9.

Το μέγεθος του δείγματος είναι  $n=10$  που είναι άρτιος αριθμός. Έτσι

$$\delta = \frac{t_5 + t_6}{2} = \frac{3+5}{2} = 4.$$

**γ.**

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{v_1(x_1 - \bar{x})^2 + v_2(x_2 - \bar{x})^2 + v_3(x_3 - \bar{x})^2 + v_4(x_4 - \bar{x})^2}{10} = \\ &= \frac{2(1-4)^2 + 3(3-4)^2 + 4(5-4)^2 + 1(9-4)^2}{10} = \\ &= \frac{2 \cdot 9 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 25}{10} = \frac{50}{10} = 5. \end{aligned}$$

**B2.**

Για να εξετάσουμε αν το δείγμα είναι ομοιογενές υπολογίζουμε το συντελεστή μεταβολής  $cv = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{5}}{4} = \frac{25\sqrt{5}}{100} > \frac{10}{100}$ .

Άρα το δείγμα δεν είναι ομοιογενές.

## ΘΕΜΑ Γ

**Γ1.** Η  $f(x) = x^2 - x + 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  με  $f'(x) = 2x - 1$ .

Λύνουμε την εξίσωση:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1/2$$

και κατασκευάζουμε πίνακα μεταβολών της  $f$ .

x	- $\infty$	1/2	+ $\infty$
f'	-	+	
f	↘	↗	

$$\text{Είναι } f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

Άρα η  $f$  παρουσιάζει στη θέση  $x = 1/2$ , ελάχιστο  $f(1/2) = 3/4$ .

**Γ2.** Είναι  $f(2) = 2^2 - 2 + 1 = 4 - 2 + 1 = 3$ , οπότε Α(2, 3).

Έστω  $y = \alpha x + \beta$  η εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο Α(2, 3). Τότε θα έχουμε:

$$3 = 2\alpha + \beta \quad (1)$$

$$\text{Όμως } \alpha = f'(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$\text{Από τις (1) και (2) βρίσκουμε } \beta = -3.$$

Άρα η εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας (ε) στο σημείο Α(2, 3) είναι

$$y = 3x - 3 \quad (\varepsilon).$$

**Γ3.**

- Για  $y = 0$  η (ε) γράφεται  $3x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ . Επομένως η (ε) τέμνει τον  $x$ ' $x$  στο σημείο Β(1, 0).
- Για  $x = 0$  η (ε) γράφεται  $y = 3 \cdot 0 - 3 = -3 \Leftrightarrow y = -3$ . Επομένως η (ε) τέμνει τον  $y$ ' $y$  στο σημείο Γ(0, -3).

**Γ4.**

Είναι:

$$\frac{\sqrt{f(x)} - 1}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} - 1}{x - 1} = \frac{x^2 - x + 1 - 1}{(x-1)(\sqrt{x^2 - x + 1} + 1)} =$$


$$= \frac{x^2 - x}{(x-1)(\sqrt{x^2 - x + 1} + 1)} = \frac{x(x-1)}{(x-1)(\sqrt{x^2 - x + 1} + 1)} =$$

$$= \frac{x}{(\sqrt{x^2 - x + 1} + 1)}$$

$$\text{Άρα } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{\sqrt{x^2 - x + 1} + 1} = \frac{1}{2}.$$

## ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.** Από το πείραμα προκύπτει το εξής δενδροδιάγραμμα:



Έτσι ο αντίστοιχος δειγματικός χώρος είναι:

$$\Omega = \{ AA, AM, AK, MA, MM, MK, KA, KM, KK \}$$

**Δ2.**  $A = \{ AM, MM, KM \}$

$$B = \{ AM, AK, MA, MK, KA, KM \}$$

**Δ3. a.** Από το **Δ2** προκύπτει ότι:

$$N(A) = 3, N(B) = 6, \text{ ενώ } N(\Omega) = 9.$$

Έτσι είναι:

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \text{ άρα } P(A') = 1 - P(A) = \frac{2}{3}.$$

$A \cap B = \{ AM, KM \}$ , με  $N(A \cap B) = 2$ , άρα:

$$P(A \cap B) = \frac{N(A \cap B)}{N(\Omega)} = \frac{2}{9}.$$

- $A - B = \{ MM \}$ ,  $N(A - B) = 1$ , άρα:

$$P(A - B) = \frac{N(A - B)}{N(\Omega)} = \frac{1}{9}.$$

- $B - A = \{ AK, MA, MK, KA \}$ ,  $N(B - A) = 4$ , άρα:

$$P(B - A) = \frac{N(B - A)}{N(\Omega)} = \frac{4}{9}.$$

- β)** Για να είναι το ενδεχόμενο  $\Gamma$  ασυμβίβαστο τόσο με το  $A$ , όσο και με το  $B$ , δεν θα πρέπει να έχει κανένα κοινό στοιχείο με το ενδεχόμενο  $A \cup B$ .

Άρα το  $\Gamma$  είναι υποσύνολο του  $(A \cup B)' = \{ AA, KK \}$

$$\text{Άρα } \Gamma \subseteq (A \cup B)' \Rightarrow P(\Gamma) \leq P[(A \cup B)'] \Rightarrow P(\Gamma) \leq \frac{2}{9}.$$

Προκύπτει ότι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει η  $P(\Gamma)$  είναι  $\frac{2}{9}$ .

### **β' τρόπος**

Για να είναι το ενδεχόμενο  $\Gamma$  ασυμβίβαστο τόσο με το  $A$ , όσο και με το  $B$ , δεν θα πρέπει να έχει κανένα κοινό στοιχείο με το ενδεχόμενο  $A \cup B$ .

Άρα θα είναι:

$$\Gamma = \{ AA \} \text{ με } P(\Gamma) = \frac{1}{9}.$$

$$\Gamma = \{ KK \} \text{ με } P(\Gamma) = \frac{1}{9}.$$

$$\Gamma = \{ AA, KK \} \text{ με } P(\Gamma) = \frac{2}{9}.$$

Προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή για το  $P(\Gamma)$  είναι  $\frac{2}{9}$ .