

ΧΗΜΕΙΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

- A1. δ.
- A2. γ.
- A3. α.
- A4. β.
- A5. δ

ΘΕΜΑ Β



- B1. α) $F < N\alpha < K$**

Η ατομική ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προς τα αριστερά κατά μήκος μιας περιόδου και από πάνω προς τα κάτω.

Έστω $_3X$ στην 1 ομάδα και 2 περίοδο. $r_3x > r_9F$ (1)
 γιατί όσο αυξάνεται το Z τόσο μειώνεται η ατομική ακτίνα κατά μήκος της ίδιας περιόδου.
 Από την άλλη x, Na, K βρίσκονται στην ίδια ομάδα σποτε $rk > rNa > rX$ (2) Αυξάνει το
 η αυξάνει και η ακτίνα .

Από (1) και (2) $\Rightarrow r_{19}K > r_{11}Na > r_9F$

Όμως ζητά αύξουσα σειρά, άρα:




τα ιόντα $CH_3NH_3^+$ και $HCOO^-$ προέρχονται από ασθενείς ηλεκτρολύτες και αντιδρούν με το νερό και έχουν ίδια C

Ξέρω ότι:

$$K_b^{CH_3NH_2} = 10^{-4} = K_a^{HCOOH} = 10^{-4}$$

άρα $K_a \text{CH}_3\text{NH}_3^+ = 10^{-10} = K_b \text{HCOO}^- = 10^{-10}$
 άρα το διάλυμα είναι ουδέτερο.



άρα το pH του διαλύματος είναι βασικό.


- B3. (ii) Επειδή πρόκειται για δ/μα ασθενούς οξέος ισχύει ο νόμος του Ostwald

$$Ka = \frac{a^2 C}{1-a} \Rightarrow Ka = a^2 C \Rightarrow a = \sqrt{\frac{Ka}{C}}$$

βγάζουμε το συμπέρασμα ότι τα ποσά είναι αντιστροφώς ανάλογα οπότε όσο αραιώνουμε ένα διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη τόσο η τιμή του a αυξάνεται.
 Άρα σωστό είναι το (ii).

B4.

a)




Από το διάγραμμα σχήμα (1) βλέπουμε ότι το $\Delta H < 0$ εξώθερμη αντίδραση.

$$\Delta H = H_{\text{προϊόν.}} - H_{\text{αντιδ.}} \rightarrow H_{\text{προϊόν.}} < H_{\text{αντιδ.}}$$

$$H_{\text{προϊόν.}} - H_{\text{αντιδ.}} > 0$$

$$\Delta H < 0$$

β) $\alpha = E_a$ ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης



i) $E_a - \Delta H = \beta$

$$209 - \Delta H = 348$$

$$\Delta H = -348 + 209$$

$$\Delta H = -139 \text{ KJ}$$

ii) $\alpha = E_a$

$$E\alpha = 209 \text{ KJ}$$

iii) σχήμα (2)

$$\beta' = \beta = E' \alpha \text{ της αντίστροφης αντίδρασης}$$



$$E'\alpha = 348 \text{ KJ}$$

ΘΕΜΑ Γ


Γ1. Ο Γενικός Μοριακός Τύπος $\text{C}_v\text{H}_{2v}\text{O}$ αντιστοιχεί σε κορεσμένες μονοσθενείς αλδεύδες ($v \geq 1$) ή σε κορεσμένες μονοσθενείς κετόνες ($v \geq 3$)

Η ένωση αντιδρά με $\text{AgNO}_3 / \text{NH}_3$, συνεπώς είναι κορεσμένη μονοσθενής αλδεύδη.

$$\text{Mr}_{\text{C}_v\text{H}_{2v}\text{O}} = 12v + 2v + 16 = 14v + 16 = 58 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 14v = 42 \Rightarrow v = 3$$





Μοριακός τύπος $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, άρα συντακτικός τύπος



Αντίδραση





Γ2.





$$\text{Γ3. } n_{\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2} = \frac{m}{M_r} = \frac{6,3}{42} = 0,15 \text{ mol}$$



Έστω x mol προπενίου μετατρέπονται σε κύριο προϊόν και y mol προπενίου μετατρέπονται σε παραπροϊόν



$x + y = \varphi$ (1) όπου φ η ποσότητα του προπενίου που μετατράπηκε σε προϊόντα



2ο μέρος: Με $I_2 / NaOH$ αντιδρά μόνο η 2-προπανόλη



από την (4) $x + 2y = 0,14 \Rightarrow 2y = 0,04 \Rightarrow y = 0,02$.


Από τα 0,15 mol $CH_3CH=CH_2$ τα $\varphi = x + y \Rightarrow \varphi = 0,12$ mol μετατρέπονται σε προϊόντα.

0,15 mol προπενίου
100 mol προπενίου

$$\alpha = \frac{12}{0,15} \Rightarrow \alpha = 80 \text{ mol}$$

άρα το προπένιο μετατράπηκε σε ποσοστό 80% σε προϊόντα.

ΘΕΜΑ Δ



Οξειδωτικό σώμα H_2O_2




αναγωγικό σώμα HI .

γ. $n_{\text{H}_2\text{O}_2} = \frac{m}{\text{Mr}} = \frac{4 \cdot 17}{34} = 2 \text{ mol } **$


(**) Από την 17% w/v

17gr H_2O_2 σε 100 mL

$$\frac{x}{x = 4 \cdot 17 \text{ gr} \text{ H}_2\text{O}_2}$$



1 mol	1 mol
2 mol	$;= 2 \text{ mol}$



0,5 0,5

x x

$\underline{(0,5-x) \quad (0,5-x) \quad 2x \quad \text{XI}}$

Αρχικά (mol)

Αντιδρούν

Παράγονται

Iσχύει: $K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]}$

$$\Rightarrow 64 = \frac{(2x)^2}{(0,5-x)^2} \Rightarrow 8 = \frac{2x}{0,5-x} \Rightarrow x = 0,4$$

Άρα στη XI:

$n_{\text{H}_2} = n_{\text{I}_2} = 0,5 - x = 0,1 \text{ mol}$

$n_{\text{HI}} = 2x = 0,8 \text{ mol}$



β. Δε μεταβάλλεται η θέση της XI. γιατί το NH_4I είναι στερεό και η συγκέντρωσή του δε μεταβάλλεται με την απομάκρυνση μικρής ποσότητας $\text{NH}_4\text{I}(s)$. Εκτός αυτού η συγκέντρωση του $\text{NH}_4\text{I}(s)$ παραλείπεται από την έκφραση της K_c .

Η συγκέντρωση των στερεών θεωρείται σταθερή και η τιμή της είναι ενσωματωμένη στην τιμή της K_c .

Δ4.

Έστω ότι διαλύονται w_1 mol HI


$$V_{\delta/\text{τος}} = 100 \text{ mL} / 0,1 \text{ L}$$

Το HI αντιδρά με την NH₃.

$$n_{\text{HI}} = w_1 \text{ mol}$$

$$n_{\text{NH}_3} = c \cdot v = 0,1 \cdot 0,1 = 0,01 \text{ mol}$$

H διάλυση του HI θα μεταβάλει το pH από 11 σε τιμή 9.




$$0,01 \quad w_1$$

Διερεύνηση:

1η περίπτωση: Πλήρης εξουδετέρωση.


Στο τελικό διάλυμα θα περιέχεται μόνο NH₄Cl οπότε το pH θα είναι < 7



2η περίπτωση: Σε περίσσεια το HI.

Στο τελικό διάλυμα θα περιέχεται το παραγόμενο NH₄I και το HI που περίσσεψε, οπότε pH < 7

3η περίπτωση: Σε περίσσεια η NH₃.




0,01	w ₁	—	αρχικά (mol)
w ₁	w ₁	—	αντιδρούν
	w ₁	—	παράγονται

Τελικό διάλυμα:

$$C_{\text{NH}_4\text{I}} = \frac{n}{V} = \frac{w_1}{0,1} M$$


$$C_{\text{NH}_3} = \frac{n}{V} = \frac{0,01 - w_1}{0,1} M$$

To NH₄I δύστανται



$$\frac{w_1}{0,1} M = \frac{w_1}{0,1} M ; = \frac{w_1}{0,1} M$$

H NH₃ ιοντίζεται



$\frac{0,01 - w_1}{0,1}$	$\frac{w_1}{0,1}$	- Αρχικά (M)
y	y	Ιοντίζονται Παράγονται


$$\frac{(0,01 - w_1) - y}{0,1} \quad \left(\frac{w_1}{0,1} + y \right) \quad y \text{ I.I.}$$

$$pH=9/pOH=5 / [OH^-] = y = 10^{-5} M$$

Iσχύει:

$$K_{b_{NH_3}} = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]} \quad (1)$$

Για την εύρεση της $K_{b_{NH_3}}$ (αρχικό διάλυμα)



$$(0,1-z) M \quad z M \quad z M$$

$$pH=11/pOH=3 / [OH^-] = z = 10^{-3} M$$

$$K_{b_{NH_3}} = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]} = \frac{10^{-3} \cdot 10^{-3}}{0,1 - 10^{-3}} \Rightarrow K_{b_{NH_3}} \approx 10^{-5}$$

$$(1) \Rightarrow 10^{-5} = \frac{\left(\frac{w_1}{0,1} + 10^{-5}\right) \cdot 10^{-5}}{\frac{0,01 - w_1}{0,1} - 10^{-5}} \Rightarrow \frac{0,01 - w_1}{0,1} = \frac{w_1}{0,1} \Rightarrow w_1 = n_{HI} = 0,005 \text{ mol}$$

Δ5) Διάλυμα Y_4 με $V_{\delta/\text{τος}} = 100 \text{ mL}$

$$C_{NH_4I} = \frac{n}{V} = \frac{0,01}{0,1} = 0,1 \text{ M}$$

a. Το NH_4I διίστανται:



$$0,1 \text{ M} \quad ; = 0,1 \text{ M}$$

I^- : ισχυρό οξύ

NH_4^+ : ασθενής βάση

Το NH_4^+ ιοντίζεται:



Αρχικά (M)

Ιοντίζονται

Παράγονται

$$(0,1-\varphi) \quad \varphi \quad \varphi \quad \text{I.I}$$

$$\text{Ισχύει: } K_{\alpha_{NH_4^+}} = \frac{K_w}{K_{b_{NH_3}}} = \frac{[NH_3] \cdot [H_3O^+]}{[NH_4^+]} \Rightarrow$$

$$\frac{10^{-4}}{10^{-5}} = \frac{\varphi^2}{0,1-\varphi} \Rightarrow \varphi = [H_3O^+] = 10^{-5} \text{ M}$$


$$pH = 5.$$

β. Έστω ότι προστίθενται w_2 mol NaOH στο Y_4 και προκύπτει Y_5 με $V_{\delta/\text{τος}} = 0,1 \text{ L}$

$$n_{\text{NH}_4\text{I}} = C \cdot V = 0,1 \cdot 0,1 = 0,01 \text{ mol}$$

$$n_{\text{NaOH}} = w_2 \text{ mol}$$


To NaOH αντιδρά με το NH₄I:



$$w_2 \quad 0,01$$

Διερεύνηση:

1η περίπτωση: Πλήρης εξουδετέρωση



$$w_2 \quad 0,01 \quad - \quad -$$


$$0,01 \quad 0,01$$

$$\begin{array}{r} & & 0,01 & 0,01 \\ \hline - & & 0,01 & 0,01 \end{array}$$

$$\text{Τελικά: } C_{\text{NaI}} = \frac{n}{V} = \frac{0,01}{0,1} = 0,1 \text{ M}$$

$$C_{\text{NH}_3} = \frac{Y}{V} = \frac{0,01}{0,1} = 0,1 \text{ M}$$

To NaI δεν επηρεάζει το pH του διαλύματος.
H NH₃ ιοντίζεται:



$$(0,1 - \kappa) \text{M} \quad \kappa \text{ M} \quad \kappa \text{ M}$$

Ισχύει

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} \Rightarrow 10^{-5} = \frac{\kappa^2}{0,1 - \kappa} \Rightarrow \kappa = [\text{OH}^-] = 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{pOH} = \frac{3}{\text{pH}} = 11. \text{ Μη δεκτό.}$$

2η περίπτωση: Σε περίσσεια το NaOH.

Στο τελικό διάλυμα θα περιέχονται η παραγόμενη NH₃ και η περίσσεια του NaOH, οπότε pH > 11. Μη δεκτό.

3η περίπτωση: To NH₄I σε περίσσεια.



$$\begin{array}{r} 0,01 \\ w_2 \\ w_2 \\ \hline (0,01 - w_2) \quad w_2 \quad w_2 \end{array}$$

Τελικό διάλυμα

$$C_{\text{NaI}} = \frac{n}{V} = \frac{w_2}{0,1} \text{ M}$$

$$C_{\text{NH}_3} = \frac{n}{V} = \frac{w_2}{0,1} \text{ M}$$

$$C_{\text{NH}_4\text{Cl}} = \frac{n}{V} = \frac{0,01 - w_2}{0,1} \text{ M}$$


To NaI δεν επηρεάζει το pH του διαλύματος.

To NH₄Cl δίστανται



$$; = \frac{0,01 - w_2}{0,1} \text{ M} ; = \frac{0,01 - w_2}{0,1} \text{ M}$$

H NH₃ ιοντίζεται



$$\left(\frac{w_2}{0,1} - \lambda \right) \text{M} \quad \left(\frac{0,01 - w_2}{0,1} + \lambda \right) \text{M} \quad \lambda \text{ M}$$

$$\text{Ισχύει: } K_b = \frac{[\text{NH}_4^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} \quad (2)$$

$$\text{pH}=9 / \text{pOH}=5 / [\text{OH}^-] = \lambda = 10^{-5} \text{ M}$$

$$(2) \Rightarrow 10^{-5} = \frac{\left(\frac{0,01 - w_2}{0,1} + 10^{-5} \right) \cdot 10^{-5}}{\frac{w_2}{0,1} - 10^{-5}} \Rightarrow w_2 = 0,005 \text{ mol NaOH}$$

H διαφορετικά:

To διάλυμα Y₅ είναι ρυθμιστικό, οπότε ισχύει:

$$\text{pOH} = \text{p}K_b + \log \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]} \Rightarrow 5 = 5 + \log \frac{\frac{0,01 - w_2}{0,1}}{\frac{w_2}{0,1}} \Rightarrow w_2 = 0,01 - w_2 \Rightarrow w_2 = 0,005 \text{ mol NaOH}$$